


Lacerta agilis LINNAEUS, 1758. Lagarto ágil.

DESCRIPCION. Morro mucho más corto que en *Lacerta viridis*. La rostral no contacta con la cavidad nasal. Una sola postnasal. Dos loreales anteriores superpuestas. Normalmente cuatro supralabiales anteriores a la subocular. Occipital pequeña. Dos o tres grandes temporales en contacto con la parietal. Timpánica ausente. Pliegue gular ausente o poco marcado. De 14 a 22 escamas gulares. Collar de borde serrado, formado por 7 a 11 escamas. Escamas dorsales hexagonales, muy aquilladas, en número de 34 a 46 en el centro del cuerpo. Ventrals en seis series longitudinales y de 25 a 32 series transversales. De 10 a 18 poros femorales a cada lado y de 16 a 23 lamelas bajo el cuarto dedo. Hembra con el dorso de color pardo, con la zona vertebral oscura y grandes manchas parduzcas con una mancha clara central. Las manchas grandes normalmente forman tres series longitudinales. El macho en celo tiene el vientre y costados de color verdoso, manchados estos últimos de negro con ocelos claros.


LONGITUD TOTAL. Hasta 220 mm.

BIOLOGIA. En contradicción abierta con su nombre, este lagarto es más bien torpe de movimientos. Se le encuentra sobre todo en los matorrales y arbustos que hay junto a los bosques. Escarba su escondrijo en la tierra o entre las raíces. De carácter territorial, los machos defienden frente a los otros su pequeño territorio y toleran que las hembras vivan en él. El período de invernada suele durar desde octubre a marzo y en primavera la aparición de los lagartos sucede escalonadamente; primero salen

los jóvenes, luego las hembras y más tarde los machos. La cópula tiene lugar en mayo y un mes más tarde las hembras suelen poner de 5 a 14 huevos, a veces en dos puestas, que miden $12-14 \times 9-10$ mm. El período de incubación varía mucho con la temperatura, aunque normalmente oscila entre 40 y 60 días. Los nacimientos tienen lugar en septiembre y las crías miden 35 a 55 mm. Los machos alcanzan la madurez sexual en su segundo año y las hembras no lo hacen hasta el tercero.



DISTRIBUCION. En España sólo se encuentra en los altos valles de los Pirineos.



Arriba, Lagartija de turbera (*Lacerta vivipara*); abajo, Lagarto ágil (*Lacerta agilis*)