



LUCERTOLA MURAIOLA

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Nomi vernacolari: **grívura, grígura, grígua, sgrígua, mesega**

NOTE TASSONOMICHE - La posizione tassonomica delle sottospecie di *P. muralis* è estremamente incerta. Secondo CAPULA (2000b) la sottospecie presente nella provincia di Savona è *P. muralis* ssp. *brueggemanni*.


DISTRIBUZIONE - La Lucertola muraiola è una specie a distribuzione mediosudeuropea ed asiatica occidentale (ARNOLD & BURTON, 1986). Nella provincia di Savona è facilmente osservabile in tutto il territorio. La presenza della specie si rileva dal livello del mare fino a 1400 metri di altitudine. *P. muralis* è presente anche sull'isola di Bergeggi (OTTONELLO & LAMAGNI, oss. pers.) e sull'isola Gallinara (SALVIDIO et al., 1992).

DESCRIZIONE - Lacertide di dimensioni medio-piccole che raramente supera i 7 cm di lunghezza fra l'apice del muso e la cloaca. Presenta un disegno dorsale molto variabile con colorazione di fondo dal grigio al bruno con strisce longitudinali più scure sui fianchi nelle femmine. I maschi durante il periodo riproduttivo presentano pori femorali più sviluppati.

HABITAT - Specie ad ampia valenza ecologica la si può osservare in quasi tutti gli ambienti presenti in provincia di Savona. Frequenta preferenzialmente ambienti ecotonali, muretti a secco, pareti rocciose, massi e tronchi d'albero.

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE - Ovipara, da una a tre deposizioni annue. Per ogni deposizione da 5 a 6 uova (GRUSCHWITZ & BÖHME, 1986).

STATUS - Basso rischio.



	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Periodo di attività		■										
Periodo riproduttivo			■			■		■				

