



Les Claris, entre Saint-Hippolyte-du-Fort et Durfort, Gard, mai 1990 (© Philippe Geniez)

## *Podarcis liolepis* (Boulenger, 1905)

### Lézard catalan

**Autres appellations** – *Podarcis hispanicus* (Steindachner, 1870), Lézard hispanique.

#### STATUT TAXINOMIQUE

Différentes études moléculaires et morphologiques récentes (Sá-Sousa 2000; Harris & Sá-Sousa 2001, 2002; Harris *et al.* 2002a,b; Sá-Sousa *et al.* 2002; Pinho *et al.* 2006) ont montré que *P. hispanicus* représente en fait un complexe d'espèces. *Podarcis hispanicus sensu stricto* est une espèce endémique du Levant espagnol (Geniez *et al.* 2007). Très récemment, Busack *et al.* (2005) ont proposé de désigner les *Podarcis* du groupe *hispanicus* du nord-est de l'Espagne (morphotype 3 de Pinho *et al.* 2006) par le binôme *Podarcis atrata* (Bosca, 1916). En fait, le nom le plus ancien pour désigner les Lézards du groupe de *P. hispanicus* autres que *P. hispanicus*, *P. vaucheri*, *P. bocagei* et *P. carbonelli* est *Podarcis liolepis* (Boulenger, 1905), décrit de Valencia (Renoult *et al.* 2010).

#### SOUS-ESPÈCES

Trois sous-espèces sont reconnues en France (Geniez & Cheylan 2005) : *Podarcis l. liolepis* limité à la plaine du Roussillon (Pyrénées-Orientales), *P. l. cebennensis* Guillaume & Geniez *in* Fretey, 1987, endémique de France, qui concerne tous les Lézards catalans de France à l'exception de ceux du Roussillon et du Pays basque, et *P. l. sebastiani* (Klemmer, 1964) endémique du Pays basque tant français qu'espagnol.

#### RÉPARTITION-HABITAT

**Répartition actuelle** – Le Lézard catalan est une espèce méditerranéenne d'origine ibérique dont la répartition française comprend presque tout le Languedoc-Roussillon, la partie caussenarde du département de l'Aveyron et une grande partie de l'Ardèche. Il atteint l'extrême sud du département du Tarn et certains coteaux ensoleil-


lés de l'Ariège et de la Haute-Garonne (Crochet & Geniez 2000). Il remonte au nord-est jusque sur les contreforts du massif du Pilat, dans le département de la Loire, le lieu-dit Montéliér, en commune de Chavanay (carte IGN 3033), marquant la limite septentrionale et orientale connue de sa distribution géographique (M. Michelot *in* Geniez & Guillaume 1989). Des prospections récentes (Pottier 2006) ont permis de le trouver beaucoup plus au nord-ouest dans les départements du Tarn et de l'Aveyron, à la faveur des vallées du Tarn et du Viaur (cartes IGN 2340, 2341, 2343, 2441 et 2442). On le revoit ensuite beaucoup plus à l'ouest, dans une petite partie du Pays basque : massif de Sarre, alentours de Béhobie, et zone frontalière avec l'Espagne, localement en vallée d'Aspe (carte IGN 1547), et à l'est jusqu'à Arnéguy dans le département des Pyrénées-Atlantiques (Gosa 2002). Il vient d'être découvert à l'est du Rhône en Provence, dans la Drôme (carte IGN 3038) et le Vaucluse (carte IGN 3040) (Geniez *et al.* 2008).

**Répartition altitudinale et habitat** – *Podarcis liolepis* se rencontre dans deux types de situation en France. En zone de sympatrie avec le Lézard des murailles, il ne colonise que les substrats rocheux soumis à une influence plus ou moins méditerranéenne sur lesquels il est souvent abondant. Lorsqu'il cohabite avec lui, le Lézard des murailles recherche plutôt des habitats plus riches en végétation, plus humides ou plus ombragés. Il est cependant possible d'observer les deux espèces se chauffant au soleil côte à côte. En situation sympatrique, le Lézard catalan évite les zones urbaines (mais colonise certains villages des zones de garrigue), les plaines agricoles et le littoral. En revanche, dans les régions où *Podarcis muralis* est absent (plaine du Roussillon et moitié orientale du département de l'Aude), il occupe tous les habitats disponibles



0 100 200 km

### Altitude



- Observations de 1970 à 1989
- Observations à partir de 1990
- △ Introduit, observations de 1970 à 1989
- ▲ Introduit, observations à partir de 1990

à l'exception des dunes littorales non végétalisées et des zones trop boisées.

Il atteint, dans les Cévennes, 1285 m d'altitude (P. Geniez & P.-A. Crochet données inédites) et en Cerdagne, commune d'Err (Pyrénées-Orientales), 1651 m (Vacher 1999).

### CONSERVATION

*Podarcis liolepis* n'est pas une espèce menacée. Il convient cependant de surveiller l'évolution des populations les plus marginales et les plus septentrionales (Pays basque français, département de la Loire et les deux nouvelles populations provençales).

**Statut liste rouge nationale : LC**

Philippe Geniez & Pierre-André Crochet

