

PODARCIS HISPANICA (Steindachner, 1870). **Lagartija ibérica**



DESCRIPCION

Es una lagartija de tamaño mediano, con una longitud total de unos 16 o 18 cm. El cuerpo es ligeramente deprimido. La cabeza es un poco aplanada. La cola es de 2 a 2,5 veces la longitud de cabeza y cuerpo.

La coloración es muy variable, dominando los tonos dorsales y costales verdes, sobre todo en los ejemplares de la sierra gaditana. La cabeza puede estar manchada de pequeñas máculas negras, en su parte superior. Las hembras suelen carecer de líneas dorsales definidas.

La coloración del vientre y garganta es de un blanco sucio, estando ésta última a veces moteada de negro. El macho en época de celo adquiere una tonalidad, en su zona ventral, que oscila desde el amarillo al rojizo, incluso rojo ladrillo en áreas de la sierra.

BIOLOGIA

En nuestra provincia no tienen una verdadera hibernación, pues en pleno invierno, cuando hace buena temperatura, se las puede ver tomando el sol sobre piedras y troncos de árboles.

Las hembras ponen entre 1 y 5 huevos varias veces a lo largo de la primavera y el verano. El período de incubación suele variar entre 60 y 70 días. Se alimentan básicamente de arácnidos, insectos, miriápodos, pequeños moluscos y otros invertebrados pequeños.

HABITAT

Es una lagartija que en Cádiz puede ser encontrada prácticamente en todos los hábitats que la componen. Ocupan los nichos que en otras zonas poseen otras especies de *Podarcis*, por lo que se las puede ver sobre árboles, paredes, piedras, sobre el suelo, etc.


En su dispersión en altura se encuentra desde el nivel del mar hasta los puntos mas altos de nuestra provincia.

STATUS Y DISTRIBUCION

Se halla ampliamente distribuida por toda la provincia, y es una especie que se ha adaptado perfectamente a vivir próxima al hombre. Su status actual podría decirse que es estable.

OBSERVACIONES

No existe una unanimidad total en cuanto a la denominación subespecífica de *Podarcis hispanica*. Hasta ahora se había considerado a la subespecie de Cádiz, como *P.b. vaucheri*, pero estudios más recientes de folidosis y biometría parece demostrar que esta subespecie es solo típica del Norte de Africa , dejando para la península a la subespecie típica *P.b. hispanica*. Hay que aclarar que estos criterios no son aceptados con unanimidad.



Distribución de *Podarcis hispanica*