

Lagarto Gigante de Tenerife

(*Gallotia intermedia*)



LAGARTO GIGANTE DE TENERIFE

Gallotia intermedia Hernández, Nogales y Martín, 2000

Identificación

Lagarto de talla mediana con 38-90 escamas temporales, 3-5 supratemporales y 14-18 series longitudinales de ventrales. Dorso de color pardo negruzco reticulado con pequeñas manchas amarillas y garganta de color gris pálido.

Distribución y abundancia

Especie endémica de la isla de Tenerife. Antes de la llegada del hombre podría ocupar gran parte de las zonas xerófilas de la isla. Podría haber vivido también en los Roques de Anaga. Considerado extinguido, se ha localizado en 1.995 una población superviviente en el Acanilado de Los Gigantes. Especie en peligro crítico.


Tamaño

La longitud de cabeza y cuerpo alcanza 150 mm en machos y en hembras.

Descripción

Orificio nasal en contacto con rostral, postnasal y primera supralabial. Seis a ocho gránulos supraciliares. Timpánica pequeña. Masetérica presente. El número de temporales varía entre 38 y 90. Tres a cinco supratemporales. Collar algo aserrado, formado por 8 a 13 escamas. 29 a 37 escamas gulares. Escamas dorsales pequeñas y aquilladas, en número de 72 a 86 en el centro del cuerpo. Ventrales dispuestas en 14 a 18 series longitudinales. Se cuentan 20 a 27 poros femorales a cada lado.

MAPA DE DISTRIBUCIÓN






Lagarto gigante de Tenerife, *Gallotia intermedia*.

Parte superior de la cabeza y región temporal negruzca con algunas manchas amarillas. Dorso de color pardo negruzco reticulado con pequeñas manchas amarillas o sin ellas. Costados pardo negruzcos con manchas gris o pardas o sin ellas. En el costado puede haber una hilera superior de ocelos azules y otra inferior de ocelos amarillos o bien carecen de ellos. Parte superior de miembros anteriores pardo negruzcos con manchas amarillas dispersas. Parte superior de miembros posteriores de color gris oscuro con retículo pardo. Región gular gris pálido con dos bandas oscuras que convergen en el tercer par de submaxilares. Vientre gris amarillento. Los juveniles tienen el dorso pardo grisáceo con manchas amarillas conspicuas. Poseen ocelos laterales azules. Parte superior de la cabeza pardo o gris anaranjado. Con manchas amarillas en supralabiales, sublabiales, submaxilares y loreales. Iris naranja.

Lagarto gigante de Tenerife, *Gallotia intermedia*. Los Gigantes, Tenerife.





Lagarto gigante de Tenerife, *Gallotia intermedia*, macho. La Hábiga, Tenerife.

Variación

Según algunos autores todos los lagartos gigantes fósiles y actuales de la isla de Tenerife pertenecen a la misma especie, *Gallotia simonyi*. Según algunos autores debería denominarse *G. s. goliath*, descrita como *G. goliath*.

Individuos de la población de La Hábiga difieren de los de otras poblaciones por tener el dorso reticulado gris pálido y carecen de ocelos en los costados.

Historia natural

No se conoce. Entre sus depredadores se conocen mamíferos (gato cimarrón).

Bibliografía

Báez y Bravo (1983), Bischoff (1998c), Bravo (1953), Castillo *et al.* (1994), Gasc (1971), González *et al.* (1996), Hernández *et al.* (2000), Hutterer (1985), Mertens (1942), Ossuna y Van der Heede (1897).