

---

2. **Psammodromus algirus** (L.). *Lacerta algira* LINNÉ, Syst. Nat., I, 1766, p. 363. — *Tropidosaura algira* FITZ., N. Class. Rept., 1826, p. 52. — *Lacerta (Algyra) Cuvieri* GRAY, Griff. An. Kingd., IX, Syn., 1831, p. 35. — *Psammodromus algirus* BOULGR., Cat. Liz., III, 1887, p. 50 et Mon. Lacert., II, 1921, p. 175. — *Psammodromus algirus* MERTENS, Abh. Senck. naturf. Ges., XXXIX, 1925, p. 84 et 451, et 1940, p. 46.

Narine entre 4 plaques, bordée en arrière et au-dessous par une étroite bande formée par la nasale. Une simple postnasale. Loréale antérieure habituellement plus courte que la seconde. Quatre (rarement 3 ou 5) labiales antérieures à la sous-oculaire. Pas de granules entre les supraoculaires et les supraciliaires. Occipitale aussi grande que l'interpariétale ou un peu plus petite (rarement beaucoup plus petite). Deux ou trois temporales

supérieures. Temporales inférieures habituellement grandes, séparées des supérieures par de petites écailles très irrégulières qui peuvent être faiblement carénées. Pas de pli gulaire. 14 à 20 écailles gulaires sur une ligne droite entre le collier et les plaques postmentonnières, l'emplacement du collier étant marqué par un pli courbé en avant de l'épaule qui sépare les écailles gulaires des ventrales. Plaque sous-oculaire beaucoup plus étroite dessous qu'au-dessus. 30 à 34 séries d'écailles autour du milieu du corps, fortement pointues et mucronées, celles des côtés passant graduellement parmi les ventrales qui ne sont pas ou ne sont qu'un peu plus larges que longues et forment 6 séries longitudinales. 22 à 29 séries transversales. Plaque préanale modérée ou petite, bordée par de petites écailles obtusément pointues. Écailles caudales semblables aux dorsales.

Le membre postérieur rabattu sur le corps atteint le coude, l'aisselle, l'épaule ou le pli anté-huméral. Lamelles sous-digitales lisses, plus ou moins distinctement tuberculeuses ou faiblement bicarénées au nombre de 19 à 24 sous le 4<sup>e</sup> orteil. 14 à 21 (habituellement 15 à 19) pores fémoraux de chaque côté. Queue 2 à presque 3 fois plus longue que la tête et le corps ensemble, souvent un peu moins de 2 fois chez le très jeune.

Longueur totale : ♂, 243 mm., queue : 167 mm. ; ♀, 267 mm. ; queue : 190 mm.

COLORATION. — Brun cuivré ou bronzé au-dessus, habituellement avec 2 lignes blanc jaunâtre ou jaune d'or de chaque côté, qui peuvent être bordées de brun sombre ou de noir. Une troisième ligne peut exister entre l'œil et l'oreille et se poursuivre aussi sur les côtés du cou. Une raie noire, entière ou dissociée, de la narine à l'œil, bifurquant ensuite est, normalement, présente. ♂ avec les flancs parfois tachés de noir et avec un ocellé bleu pâle au-dessus de l'épaule. Une ligne vertébrale brun sombre ou noir est parfois présente. Au-dessous, blanc jaunâtre ou blanc verdâtre, la face inférieure des membres postérieurs et de la queue, orangée ou rouge chez le jeune.

Une forme mélanique, noirâtre au-dessus avec des taches bleu pâle et gris bleuâtre au-dessous est particulière à l'île Galitone, près de la Galite en Tunisie. Elle a été désignée sous le nom de variété *doriae* par Bedriaga.

Côtes méditerranéennes de France, Espagne, Portugal, Maroc, jusqu'à 1.500 m. d'altitude, Algérie, y compris le Nord du Sahara et la Tunisie.

Signalé des départements de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales (où il est commun dans les garrigues de la région de Banyuls et de Cerbère). Selon SALGUES (1937) il se rencontrerait également dans l'Aude et le Gard. C'est vraisemblablement à l'une des deux espèces ci-dessus du genre *Psammodymus* que doivent être rapportés les exemplaires trouvés au siècle dernier dans les départements de l'Hérault et du Gard, qui furent mentionnés comme appartenant au genre *Acanthodactylus*. Les espèces de ce genre ne sont connues que d'Espagne et du Portugal, de l'Afrique du Nord et du Sud asiatique.